肠胃"假日病"怎么快速恢复'





近报健康智囊团专家 郝洪升

硕士生导师、教授、山东大 学齐鲁医院消化内科主任医师、 山东省医学会消化内镜专业委 员会秘书及常务委员《中华医 药杂志》、《中华现代中西医杂 志》、《中华现代临床医学杂志》 编委。擅长消化内镜的操作与内 镜下胃肠道息肉的治疗,胃粘膜 病变,慢性胃炎,肠炎,急性胰腺 炎、慢性腹痛及腹泻的诊治

专家门诊时间:周二、周五

地址: 济南市文化西路 107 号,山东大学齐鲁医院消化内科。

刘女士: 医生您好, 春节假期之后肠胃一直不舒服, 时有腹痛、腹胀的情况, 有时候吃饭恶心 反胃,甚至还出现呕吐的症状,但是其他和我吃同样食物的人没有此种不良反应,经过胃镜肠镜 的检查没有发现器质性病变,请问这种情况是什么原因引起的?需要怎么治疗才能尽快康复?



专家郝洪升:根据你的描 述,应该属于功能性肠胃病,春 节后来就诊的人群中有一半都 是和你情况相同的消化类"假日 "。常见的几种功能性胃肠病 有肠易激综合征、功能性消化不 良、胃食管反流、功能性食管原 性胸痛和功能性腹痛五种,患者 常具有胃肠道外症状,如呼吸困 难、心慌、慢性头痛、肌痛等症

状,这种病是牛理、精神心理和 社会因素复杂相互作用而产生 的消化系统功能性的综合病征。

改善此类疾病,需要讲行饮 食、情绪和运动三方面的调节。饮 食方面,注意多吃蔬菜、水果,清 淡健康饮食,避免辛辣生冷等刺 激食物,特别是油炸类食物,因 为这些会加剧消化道和肠胃的 负担,小米粥和牛奶是不错的养

胃食品。

第二个关键点是改善心情。 功能性胃肠病作为生物-心理-社会医学模式的典型性疾病,精 神、心理因素、应激及生活事件 对患者的影响比较大。换句话 说,被诊断出的"功能性胃肠病 或许并非一定是肠胃有问题,可 能是情绪受了"伤"

脑和肠胃存在紧密的内在 联系,"脑肠轴"联系脑补神经和 肠胃,可以控制肠道的运动和分 泌情况。焦虑烦躁、情绪激动,都 容易引起"脑肠轴"紊乱,从而引 起腹痛、腹泻等肠胃问题。而节 日期间的生活作息紊乱也是致 病因素,保证睡眠时间和质量, 有益于改善肠胃疾病。除此之 外,健康运动也是必不可少的, 饭后散步、腹部按摩操等适度运 动均可改善病情

总而言之,肠胃"假日病"要 想快速恢复,饮食和心理调节要 双管齐下。记者 刘一梦 整理 ◎家庭药箱

很多常用药 属于同一家族

首都医科大学附属北京 世纪坛医院药剂科主管药师 金锐介绍,一些西药在名称上 会有相同的前缀或后缀,了解 这些"家族"名称,有助于防止 吃药时犯低级错误

头孢、沙星:抗菌"家族" 药名为头孢XX的,大都是很 常用的抗菌药,例如头孢拉 定、头孢呋辛、头孢羟氨苄、头 孢曲松等。它们是用来治疗感 染性炎症的 比如上呼吸道感 染、下呼吸道感染、皮肤软组 织感染、泌尿道感染等等,但 不同头孢的治疗侧重点不同, 需要根据感染的类型选用。

此外,XX沙星多是沙星 类药物,它也是很常用的抗生 表 ラ --,例如环丙沙星、氧氟 沙星、左氧氟沙星、莫西沙星 等。它们也是用来治疗感染性 炎症的,广泛用于呼吸系统感 染、泌尿系统感染、皮肤软组 织感染、肠道感染等。需要注 意的是,18岁以下患者禁用沙 星类药物,以免对骨骼发育造 成影响。

拉唑:抑制胃酸"家族 比如奥美拉唑、埃索美拉唑、 兰索拉唑、半托拉唑等。它们 常用来治疗胃溃疡、十二指肠 溃疡、反流性食管炎等消化道 疾病。由于这类药物会影响胃 酸分泌,同时服用其他药物的 患者,用这类药前应咨询医生 和药师,以避免相互作用。

普利、地平:降压"家族" 药名为XX普利的药物,学名 称作血管紧张素转化酶抑制 剂,是治疗高血压的一线药物 例如卡托普利、贝那普 利、依那普利等。使用普利类 降压药时,需要注意干咳的副 作用。地平类药物学名称为钙 离子通道拮抗剂,也是治疗高 血压的一线药物,例如硝苯地 平、氨氯地平、尼群地平、拉西 地平等。其中,硝苯地平是最 常用的降血压和缓解心绞痛 的药物之-综合

尼文佳 田田

耳聋基因免费筛查活动

3月3日是第19个全国爱 耳日,山东省中医院将举行义诊 活动和"耳聋基因免费筛查"的 关爱活动

活动一: 耳聋基因免费筛查

活动时间:2月27日至3月3

活动地点:山东中医药大学 附属医院西院区,中西医结合生 殖与遗传中心

具体项目:1. 对孕前夫妇-方/双方听力障碍或耳聋患儿生 育史的患者,进行遗传性耳聋基 因检测的项目筛查,检测名额为 10名

2.对备孕母亲或是孕妇进 行药物性耳聋基因的检测,名额 为144名

联系申.话:0531-68617428: 0531-68617980

活动二:耳鼻喉科和儿科义诊

♥ 诊时间:3月2日 上午9:00 义诊地点:东院区扁鹊楼一 楼大厅

活动内容:1、免费提供耳科 疾病咨询

2、免费体验专业的助听器 验配咨询、保养和试戴

3、免费体验耳穴压豆治疗 耳鸣、耳聋。

冠心病相关知识健康讲座

提到心肌梗死,很多人认 为急性胸痛就是发病前兆。不 过,济南市中心医院心内科专 家王磊提醒说,一些非典型部 位剧烈疼痛也是心肌梗死的 前兆。3月3日,王磊将举办冠 心病相关知识的健康讲座,现 场为50名市民提供免费咨询、 义诊机会

讲座时间: 3 月 3 日 9:30-

讲座地点:大明湖党群服 务中心(按察司街 66 号大明湖 小学西邻100米路南),乘坐 K59、101、K50、K151、31 路公

交车在青龙桥站点下车后步 行 200 米即到

专家:王磊,山东大学附 属济南市中心医院心内科冠 心病监护病房主任,副主任 医师。山东省医学会起搏及 电生理协会青年委员会副主 任委员。擅长冠心病、高血压 病、心力衰竭等心脏疾病的 诊断、药物治疗及冠脉介入 治疗及起搏器植入及程控,目 前致力于心内科危重症的抢 救及治疗

> **专家门诊时间**:周三上午 联系电话: 0531-88519171

◎ 儿科门诊

孩子咳嗽原因不明 别乱吃止咳药

咳嗽以后到底要不要给孩 子吃药?虽然止咳药能够暂时缓 解咳嗽症状,但它可能使大量痰 液和病菌堆积于呼吸道内,继发 细菌感染。因此,杭州市第一人 民医院儿科主任黄先玫表示,在 未明确孩子咳嗽原因之前,不要 刮.喂止咳药

咳嗽是人体的一种保护性 反射, 呼吸道内的病菌和痰液均 可通讨咳嗽而排出体外, 起清洁 呼吸道并使其保持通畅的作用。 一些家长发现孩子稍有咳嗽,便 急于给孩子服用各种止咳药、止 咳糖浆。止咳药进入人体后能讯 速作用于咳嗽中枢,产生强有力 的止咳效果。这种做法虽可暂时 缓解咳嗽症状,但可能引发细菌 感染,严重时出现胸闷、呼吸困 难,甚至引起肺不张、心力衰竭 而危及生命

如果患儿在咳嗽的同时,伴 有其他表现,如发热、气急、精神 差,需及时就诊。据《健康时报》 ◎ 医学前沿

"这些病不用去国外治"系列一

颤患者到国外反被推回

"中国医生已经走向了世 界,国内患者是时候停下去国外 治病的脚步了!"中国医学科学 院阜外医院心内科主任姚焰说。 虽然在整体医疗治疗质量排名 中,中国并非名列前茅,但对于 很多领域的重大疾病治疗,特别 是心脏病、器官移植、神经疾病、 血液病等领域,国内的诊疗技术 都已经处于世界领先水平。

我国有世界最大 和第二大心脏治疗中心

"去年,一位退休的老干部 来我这里做手术。"中国医学科 学院阜外医院姚焰主任医师介 绍说,"这个患者告诉我,他去了 美国,那里的白人医生推荐他回 中国做。

房颤是心房颤动的简称,也 是最常见的心律失常之一。随着 年龄的增长,房颤发生率不断增 加,70岁以上人群可达10%。"就 分别是世界上最大和第二大的 心脏治疗中心,无论是技术还是 设备,都是世界一流。"已经从事 房颤治疗近30年的姚焰说,房 颤的导管消融手术在国内治疗 费用平均是9万人民币甚至更 低,但美国医院的中等价位是9 万美元,高价的医院甚至可达到 15 万美元左右, 换算汇率就是国 内 6-10 倍,如果把越洋路途、住 宿、中介等费用全都算在内,总 花费要在国内的十倍以上。

"中国肾移植水平已经 达到和美国同样高度"

"在来北京检查前,父母 直在凑钱想送我去国外做肾移 植。"黑龙江省鸡西市的肾移植 受者孙超告诉记者,到北京以后 才发现没必要。孙超现在已是术 后第5年,恢复的很好

和孙超一家有相同感受的

还有来自美国的知名专家。"来 中国之前,完全没有想到中国的 肾脏移植水平已经达到了和美 国同样的高度,很想和中国团队 建立长久的联系。"作为全美最 杰出的肾脏移植外科医生之 Dr. Matthew Cooper在2017年访 华时对首都医科大学附属北京 友谊医院泌尿外科主任田野这 样说

为了让记者更好地了解我 国肾移植现状,上海仁济医院肾 移植中心主任张明给出一组数 据:截至2017年底,仅上海交通 大学附属仁济医院一家移植中 心就已经开展各类肾移植术 1800余例。国内术后移植肾存活 时间的指标已达到国际先进水 平,以上海仁济医院为例,肾移 植受者术后一年带肾健康存活 率达到95%以上,五年移植肾健 康存活率超过83%,十年生存率 据《健康时报》

糖友用完药 不要立即运动

糖友要注意错开用药和 运动的时间问题。中山大学 附属第六医院雅和病区副主 任王奕晖分享了一个案例,65 岁的老刘是个老糖友,前不 久. 老刘带着降糖药和干粮. 到了目的地吃上药开始运 动,还不到10分钟,就出现了 头晕、乏力、心悸等典型的低 血糖效应。老刘十分纳闷,不 是提倡糖尿病人要多运动吗? 了解到老刘是在运动前服药 的情况之后, 医生告诉他, 出 现低血糖,是运动和用药的 时间没有错开的缘故

建议糖友以餐后运动为 宜,并避开药物作用高峰期。 运动本身就消耗血糖,如服 用降糖药或打短效胰岛素, 应用药1小时后再运动,这样 才能避免两个降糖作用的叠 加,降低低血糖发生率。中、 长效胰岛素作用较为平稳, 时间要求上可以不用如此的 严格。 综合